



Corrector de carencias múltiples



- CORRECTOR DE COMPOSICIÓN MÚLTIPLE
- ULTRASOLUBLE PARA TODO TIPO DE AGUAS
- ASIMILACIÓN ÓPTIMA POR VÍA FOLIAR Y POR VÍA RADICULAR
- APROPIADO PARA TODOS LOS CULTIVOS Y EN CUALQUIER MOMENTO

PHYT-ACTYL es un extracto concentrado y liofilizado de algas, muy rico en sustancias bioestimulantes antiestrés (citoquininas, ácido abscísico y ácido indolacético), vehiculantes (ácido algínico), polisacáridos, aminoácidos y vitaminas que activan el metabolismo de la planta. De este modo se obtiene una mejor asimilación de nutrientes y por tanto una óptima producción de tejidos vegetales y frutos.



ABONO C. E. Corrector de carencias de Magnesio y Microelementos (B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn)

**MEZCLA SÓLIDA DE MAGNESIO Y DE MICROELEMENTOS QUELATADOS
PARA PREVENIR Y CORREGIR CARENCIAS MÚLTIPLES**

APLICACIONES Y DOSIFICACIONES

FERTIRRIGACIÓN (Riego por goteo)

Aportado por separado y/o combinado con otros abonos hidrosolubles KSC - PHYTACTYL, se puede añadir KSC - MIX en la etapa final del riego, utilizando sólo agua en los últimos minutos. Las aplicaciones pueden realizarse progresivamente a lo largo de todo el cultivo o puntualmente cuando se detecten carencias nutricionales. A modo orientativo se recomiendan las dosis siguientes:

	Dosis (Kg./ Ha.)	Aplicación (días)
Flores	0,3 - 0,6	15 - 30
Hortícolas de hoja	0,3 - 0,8	15 - 30
Hortícolas de fruto	0,3 - 1	15 - 30
Hortícolas de raíz - bulbo	0,3 - 0,8	15 - 30
Hortícolas de flor	0,3 - 0,8	15 - 30
Fresas y fresas	0,4 - 1	15 - 30
Algodón	0,3 - 0,5	15 - 30

	Dosis (Kg./ Ha.)	Aplicación (días)
Viñedo	0,2 - 0,4	7 - 15
Frutales pepita	0,4 - 1	7 - 15
Frutales de hueso	0,4 - 1	7 - 15
Cítricos	0,4 - 1	7 - 15
Olivos	0,5 - 1,5	15 - 30
Viveros	CONSULTAR	CONSULTAR

ENRIQUECIMIENTO DE SUSTRATOS

Distribuir homogéneamente 15 - 30 gramos de KSC - MIX por cada m³ de sustrato.

PULVERIZACIÓN FOLIAR

Mediante cuba de pulverización foliar o atomizador se puede aplicar KSC-MIX. Las dosis orientativas se exponen en los cuadros siguientes. El volumen de dilución máximo es el 4%. Para esta aplicación se deben evitar las horas de máxima temperatura y elegir el comienzo o el final del día.

	Número Aplicaciones	Concentración (gr./ l.)	Dosis total (Kg./ Ha.)
Alfalfa	3 - 5	1 - 1,5	2 - 4
Cereales	1 - 2	3 - 4	2 - 3
Algodón	2 - 3	2,5 - 3	2 - 3
Patata	2 - 3	1 - 1,5	1,5 - 3
Remolacha	2 - 3	1 - 2	1,5 - 3
Tabaco	2 - 3	0,5 - 1	1 - 3

	Número Aplicaciones	Concentración (gr./ l.)	Dosis total (Kg./ Ha.)
Viñedo	2 - 5	1 - 1,5	2 - 4
Frutales de pepita	3 - 5	0,75 - 1,5	3 - 7
Frutales de hueso	3 - 6	0,75 - 1,5	3 - 8
Cítricos	3 - 6	0,5 - 1,5	3 - 8
Olivos	2 - 3	0,5 - 2	2 - 3
Viveros	2 - 4	0,5 - 1	2 - 4
Flores	2 - 5	0,2 - 0,4	1 - 2

Como advertencia general, no se deben hacer estos tratamientos durante la floración.

En caso de RIEGO POR ASPERSIÓN en cultivos herbáceos extensivos se debe aplicar KSC-MIX en la etapa final de riego evitando lavados posteriores. La dosis varía entre 1,5 y 2 Kg./Ha. y semana.

OTRAS POSIBILIDADES

También es posible añadir KSC-MIX en riegos por inundación de surcos o de sectores disolviendo 100-150 gramos de producto en 100 litros de agua. No se recomienda sobrepasar la dosis de 2 Kg./Ha. y semana. Para otros casos y/o cultivos especiales consulte a nuestro Servicio Técnico Agronómico.



PRESENTACION

Cubos de plástico de 10 Kg. conteniendo 2 bolsas de plástico de 5 Kg.



Polígono Arazuri-Orcoyen, Calle C, nº 32
31160 ORCOYEN Navarra - España
Teléfono 948 324 500 - Fax 948 324 032
timacagro@timacagro.es • www.timacagro.es

