

Actisan'R



TIMAZOO TEC

L'essenza stessa della nutrizione

COMPLESSO MINERALE ASSORBENTE E IGIENIZZANTE PER L'IGIENE DELLA LETTIERA NEGLI ALLEVAMENTI DI RUMINANTI E MONOGASTRICI

ACTISAN'R è un sanificante per lettiera, che contiene una sostanza capace di lavorare in prevenzione dei problemi podali e delle mastiti, diminuendo le cellule somatiche e le infezioni. Azione: DISINFETTANTE, SANIFICANTE, ESSICANTE.



TIPOLOGIA CAPI



BOVINI



CAVALLI



OVINI



CAPRINI

FORMATO E CONFEZIONE



POLVERE



SACCO



**CONTIENE
OLIO ESSENZIALE
DI CITRONELLA**

SENZA ACTISAN'R

- Lettiera non controllata con problematiche legate alla presenza di umidità, ammoniaca, incrostazioni e proliferazione di batteri ambientali
- Minore salute della mandria
- Maggiore rischi sanitari

PERDITE ECONOMICHE

CON ACTISAN'R

- Maggior benessere animale, in termini di maggior comfort, maggior pulizia e riduzione di odori
- Minori spese sanitarie

CRESCITA DEL REDDITO DELL'ALLEVAMENTO

SANIFICANTE PER LETTIERE

MINORI RISCHI DI PROBLEMI SANITARI

- Acidificazione dell'ambiente con conseguente riduzione della flora patogena
- Minor incidenza di mastiti ambientali (E. coli), candidosi e malattie della pelle (lieviti), tigna e micosi (muffe)


MIGLIOR COMFORT PER GLI ANIMALI

- Sostanza dermoprotettiva contenuta nel prodotto
- Assorbimento irreversibile dell'acqua fino al 300% del suo peso

MIGLIORE QUALITÀ DELLE PRODUZIONI

- Controllo del tasso di cellule somatiche nel latte con conseguente aumento della qualità e della produzione di latte

PRESENZA DI PATOGENI



Indagini svolte presso clienti Timazootec

MODALITÀ D'USO

Distribuire Actisan'R in modo omogeneo sulle zone di riposo:

Bovini: Lettiere permanenti:

Dose d'attacco: 300 g/adulto ogni 2 giorni (da ripetere 1 settimana al mese)

Dose di mantenimento: 200 g/adulto ogni 2 giorni; 100 g/vitello ogni 2 giorni.

Cucchette: 100 g ogni 2 giorni (applicare sull'ultimo terzo strato della cuccetta).

Pediluvi a secco: mettere 5 cm di Actisan'R nella vasca posta in un punto di passaggio (es. uscita della sala di mungitura).

Utilizzare una o più volte al mese secondo necessità.

Ovini/capri: 25 g/adulto ogni 2 giorni (raddoppiare la dose nei periodi del parto).

Cavalli: 100 g/m² a settimana in una o più volte.